

A1. Je dána soustava lineárních rovnic tvaru $AX = B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

- Rozhodněte, zda daná matice A je symetrická a zároveň pozitivně definitní. Ověřte, zda daná matice A je ostře diagonálně dominantní.
- Ověřte, že pro danou matici A je Gaussova-Seidelova iterační metoda konvergentní!
- Volte $X^{(0)} = B$ a proveďte výpočet $X^{(1)}$ Gaussovou-Seidelovou iterační metodou.

A2. Je dáno $h > 0$, $D > 0$ a Cauchyova úloha $y' = -2y$, $y(0) = D$.

- Užitím Taylorova rozvoje odvoďte náhradu derivace $y'(x)$ pomocí hodnot $y(x)$, $y(x-h)$. Užitím této náhrady odvoďte vzorec pro Eulerovu implicitní metodu pro numerické řešení Cauchyovy úlohy.
- Užitím implicitní Eulerovy metody a kroku h spočítejte (vyjádřete) hodnoty aproximace řešení v bodech x_j pro $j = 1, 2$ a $j = n$.
- Užitím explicitní Eulerovy metody a kroku h spočítejte (vyjádřete) hodnoty aproximace řešení v bodech $x_j = jh$, $j = 1, 2, 3$ a $j = n$.

A3. Je dána Dirichletova okrajová úloha pro Poissonovu rovnici

$$-\Delta u = -x + 3y$$

v oblasti $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dané jako vnitřek čtyřúhelníku $[0; 0]$, $[1.7; 0]$, $[0; 1.5]$, $[1.5; 1.5]$. Na hranici oblasti $\partial\Omega$ je daná okrajová podmínka $u(x, y) = x - 2y$.

- Užitím Taylorova rozvoje pro $y \in \mathcal{C}^4(I)$ v bodě x_i vyjádřete hodnoty v bodech $x_i \pm h$. Odvoďte náhradu $y''(x_i)$ pomocí hodnot $y(x_i + h)$, $y(x_i)$ a $y(x_i - h)$ a zapište jaké chyby se dopustíte.
- Pomocí parciálních derivací rozepište symbol Δu uvedený v zadané úloze. Rozepište, jak se v regulárním uzlu $P_{i,j} = [x_i, y_j]$ nahradí tyto parciální derivace, a odvoďte rovnici pro náhradu dané rovnice metodou sítí v regulárním uzlu $P_{i,j}$.
- Volte krok $h = 0.5$ a síť tak, aby bod $[0, 0]$ byl uzlem sítě. Sestavte síťové rovnice na přímce $y = 1$. V neregulárním uzlu užíjte lineární interpolaci.

A4. V oblasti $Q_T = \{[x, t] : x \in (1, 5), t \in (0, T)\}$ je zadána smíšená úloha pro rovnici vedení tepla

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0.5 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x + 2t, \quad u(x, 0) = x, \quad u(1, t) = 1 + 3t, \quad u(5, t) = 2t + 5,$$

- Zapište, jak se nahradí $\frac{\partial u}{\partial t}$ a $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ v uzlu $P_i^k = [x_i, k\tau]$ na k -té časové vrstvě při odvození explicitního schématu pro řešení dané rovnice. Užijte tyto náhrady pro danou rovnici a toto schéma odvoďte. Zapište podmínku jeho stability.
- Ověřte, zda jsou splněny podmínky souhlasu (tyto podmínky uveďte)! Rozhodněte, zda explicitní schéma bude stabilní pro volbu prostorového kroku $h = 1$ a časového kroku $\tau = 0.5$.
- Volte $h = 1$ a $\tau = 0.5$ a pomocí explicitního schématu určete přibližnou hodnotu řešení v bodě $A = [4, 0.5]$.

B1. Je dána soustava lineárních rovnic tvaru $AX = B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

- Je daná matice A ostře diagonálně dominantní? Je daná matice A symetrická a zároveň pozitivně definitní? Zdůvodněte!
- Určete $X^{(1)}$ Gaussovou-Seidelovou iterační metodou při volbě $X^{(0)} = B$.
- Spočítejte řádkovou normu $\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_\infty$.

B2. Je dána Cauchyova úloha

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Určete interval maximálního řešení dané úlohy.
- Užitím Collatzovy metody s krokem $h = 1$ spočítejte přibližnou hodnotu $X(1)$.

B3. Je dána smíšená úloha pro rovnici vedení tepla

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4x \quad \text{v oblasti } \Omega = \{[x, t] : x \in (-1, 1), t > 0\},$$

$$u(x, 0) = 2x + 2 \text{ pro } x \in \langle -1, 1 \rangle \text{ a } u(-1, t) = 0, \quad u(1, t) = 4 - t \text{ pro } t \geq 0.$$

- Ověřte, zda jsou splněny podmínky souhlasu. Tyto podmínky uveďte.
- Zapište vzorec pro explicitní schéma a podmínku jeho stability. Ověřte, zda je pro volbu $h = 0.25$ a $\tau = 0.01$ je splněna.
- Určete přibližnou hodnotu řešení v bodě $A[0.5, 0.01]$ užitím explicitního schématu. Volte krok h a τ dle b).

B4. Je dána okrajová úloha pro Poissonovu rovnici, tedy

$$-\Delta u = 2x + y$$

v oblasti tvořené čtyřúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[3.5, 0]$, $[3, 2]$, $[0, 2]$, kde na hranici je předepsána Dirichletova okrajová podmínka $u(x, y) = 2 - x$.

- Nakreslete oblast a síť s krokem $h = 1$ (síť volte tak, aby bod $[0, 0]$ byl uzlem sítě). Vyznačte regulární, neregulární a hraniční uzly. Zapište souřadnice všech těchto uzlů na přímce $y = 1$.
- Sestavte všechny síťové rovnice, které vzniknou při řešení úlohy metodou sítí s krokem $h = 1$. V neregulárních uzlech užíjte lineární interpolaci.