

Matematika I – přednáška 22

Shrnutí co bylo minule

Určitý integrál.

Co bude dnes

Vybrané vlastnosti a výpočet Riemannova integrálu.

Tyto slidy jsou na adrese

<http://marian.fsik.cvut.cz/~valasek/teaching>

(pro osobní potřeby, nenahrazuje přednášku ani skripta).

Matematika I – přednáška 22**Zobecnění věty z konce minulé přednášky:**

Věta (Leibniz, Newton). Je-li f po částech spojitá a omezená funkce v intervalu $\langle a, b \rangle$ a F je primitivní funkce k f v $\langle a, b \rangle$, pak

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b \quad (= F(b) - F(a)).$$

Příklady. Vypočítejte určité integrály (pokud existují).

1) $\int_0^\pi \sin x \, dx$ 2) $\int_{-5}^5 \frac{dx}{x}$ 3) $\int_0^2 x^2 \, dx$ 4) $\int_{-1}^2 (4x^3 - 2x^2 + x + 4) \, dx$

Řešení: viz TABULE

Integrace per–partes v Riemannově integrálu.

Věta (o integraci per partes v Riemannově integrálu). Předpokládejme, že funkce u a v mají spojité derivace v intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom

$$\int_a^b u'v \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \, dx.$$

Příklad. Vypočítejme $\int_{-2}^1 2x e^x \, dx$.

Užijeme integraci per–partes: $\left[\begin{array}{l} u' = e^x, \quad v = 2x \\ u = e^x, \quad v' = 2 \end{array} \right]$. Dostáváme:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 2x e^x \, dx &= [2x e^x]_{-2}^1 - \int_{-2}^1 2 e^x \, dx = 2e - 2(-2)e^{-2} - [2e^x]_{-2}^1 \\ &= 2e + 4e^{-2} - 2e + 2e^{-2} = 6e^{-2}. \end{aligned}$$

Další příklady: viz TABULE

Substituční metoda v Riemannově integrálu.

Věta (o integraci substitucí v Riemannově integrálu). *Nechť funkce g má spojitou derivaci v intervalu $\langle a, b \rangle$ a zobrazuje $\langle a, b \rangle$ do intervalu J . Nechť funkce f je spojitá v J . Potom*

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(s) ds.$$

Příklad. Vypočítejme $\int_0^3 \frac{s}{\sqrt{s+1}} ds$.

Užijeme substituci: $\left[\begin{array}{ll} \sqrt{s+1} = x, & s = 0 \dots x = 1, \\ \text{tj. } s = x^2 - 1, & s = 3 \dots x = 2 \\ ds = 2x dx \end{array} \right]$. Dostáváme:

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{s}{\sqrt{s+1}} ds &= \int_1^2 \frac{x^2 - 1}{x} 2x dx = \int_1^2 (2x^2 - 2) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - 2x \right]_1^2 \\ &= \frac{16}{3} - 4 - \frac{2}{3} + 2 = \frac{14}{3} - 2. \end{aligned}$$

Další příklady: viz TABULE

Riemannův integrál jako funkce horní meze.

Věta (Riemannův integrál jako funkce horní meze). *Předpokládejme, že f je integrovatelná funkce v intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak*

a) *funkce $P(x) := \int_a^x f(t) \, dt$ je spojitá v $\langle a, b \rangle$,*

b) *rovnost $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$ platí ve všech bodech $x \in (a, b)$, ve kterých je funkce f spojitá.*

Princip důkazu: viz TABULE

Poznámka. Výrok b) lze modifikovat i pro případy, kdy $x = a$ nebo $x = b$:

b)' *je-li f spojitá zprava v bodě a , pak $P'_+(a) = f(a)$,*

b)'' *je-li f spojitá zleva v bodě b , pak $P'_-(b) = f(b)$.*

Odtud vidíme:

- 1) **Je-li funkce f spojitá v intervalu $\langle a, b \rangle$, pak P je primitivní funkce k f v $\langle a, b \rangle$.**
- 2) **Výpočet určitého integrálu a derivování podle horní meze jsou inverzní (= opačné) operace.**

Důsledek: Je-li F nějaká (obecně jiná) primitivní funkce k f v intervalu $\langle a, b \rangle$, pak

$$F(x) = P(x) + C \quad \text{pro } x \in \langle a, b \rangle.$$

Dosaď me $x = a$. Dostáváme: $F(a) = P(a) + C = C$.

Dosaď me $x = b$. Dostáváme: $F(b) = P(b) + C = \int_a^b f(x) \, dx + F(a)$.

Odtud plyne: $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) \, dx$. Což je odvození Leib.-Newt. formule.